

Allegato 1. FAC SIMILE PROMEMORIA FUNZIONE ACCESS POINT

**Fattori di rischio per filtrare l'accesso dei pazienti/visitatori
alle strutture residenziali per pazienti con disturbi del neurosviluppo e/o
disabilità intellettiva**

Porre le domande al paziente/visitatore ad almeno **1,5 m di distanza**

1) Il paziente/visitatore ha almeno uno dei seguenti sintomi:
febbre (nel dubbio misurare), tosse, difficoltà respiratoria?

☐ **SI** ☐ **NO**

Nelle **due settimane** (14 giorni) **precedenti** all'accesso:

2) il paziente/visitatore è stato in zone con **trasmissione locale***

☐ **SI** ☐ **NO**

3) il paziente/visitatore è stato in **contatto stretto**** con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19;

☐ **SI** ☐ **NO**

E' sufficiente la presenza di **un solo fattore di rischio** perché l'operatore debba invitare la persona ad **indossare la mascherina** chirurgica ed a **ritornare al proprio domicilio**, per mettersi in contatto con il proprio **medico di famiglia** e con l'igiene pubblica.

Nel caso di accesso motivato da situazioni eccezionali e non rinviabili autorizzate dalla direzione, l'operatore invita il paziente/visitatore ad **indossare la mascherina**, a **lavarsi frequentemente le mani** ed **avvisa il della struttura dell'arrivo del paziente/visitatore**, in modo tale che gli operatori si possano preparare ad accoglierlo

Qualora la persona che accede alla struttura si rifiuti di sottoporsi alle verifiche, l'operatore allerta la direzione della struttura.

Allegato 1. FAC SIMILE PROMEMORIA FUNZIONE ACCESS POINT

* Aggiornamento quotidiano della **lista dei Paesi con trasmissione locale**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

Per l'Italia si può tener conto della situazione epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente dall'ISS

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati>

**** Il contatto stretto** di un caso probabile o confermato è definito come.

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto **entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia** nel caso in esame

Nel punto di accesso alla struttura in cui si esercita la funzione di checkpoint sono presenti:

- gel alcolico
- mascherine chirurgiche e FFP2 senza valvola
- termometro
- materiale informativo sul coronavirus
- materiale informativo sulle buone pratiche per la prevenzione delle infezioni
- numero di telefono direzione della struttura
- per gli operatori sono presenti i DPI indicati (guanti e mascherina chirurgica da indossare quando sono a meno di 1 metro e mezzo di distanza dagli utenti).

La postazione degli operatori deve essere distanziata almeno 1,5m dal punto di accesso del paziente/visitatore mediante vincoli fisici (es scrivania) o segnaletica orizzontale (es. striscia a terra).